

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

## Gebrauchsinformation

### 58 Trillium S

#### Zusammensetzung:

100 g (= 110,4 ml) Mischung enthalten:	
Arzneilich wirksame Bestandteile:	
Hamamelis D1 Dil.	20,0 g
Crocus D3 Dil.	10,0 g
Trillium pendulum (HAB 1934) D2 Dil. (HAB 1, Vorschr. 3a)	50,0 g
Sonstige Bestandteile: Ethanol 15 % m/m.	

Dieses Präparat enthält 62,0 Vol.-% Alkohol.

Mischung, Originalpackungen zu 50 ml (N1) und 100 ml (N2).

Homöopathisches Mittel zur Blutstillung.



NESTMANN Pharma GmbH  
Weiherweg 17, D-96199  
Zapfendorf/Bamberg, Tel. 09547/92210  
Fax 09547/215

#### Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich aus den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.  
Dazu gehören: Innere und äußere Blutungen (Hämorrhoidalblutungen, Nasenbluten, Blutungen nach Zahnextraktion), Blutungen nach operativen Eingriffen.

#### Hinweis:

Bei akuten Blutungen stehen die Maßnahmen der Ersten Hilfe, des operativen Eingriffes und des Blutersatzes selbstverständlich im Vordergrund.

#### Gegenanzeigen:

*Wann dürfen Sie 58 Trillium S nicht einnehmen?*

Wegen des Alkoholgehaltes soll 58 Trillium S bei Alkoholkranken nicht angewendet werden.

*Wann dürfen Sie 58 Trillium S erst nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden?*

Wegen des Alkoholgehaltes soll 58 Trillium S bei Leberkranken, Epileptikern und Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

*Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?*

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen und aufgrund des Alkoholgehaltes sollte 58 Trillium S in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

#### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

##### Warnhinweis:

Dieses Arzneimittel enthält 62,0 Vol.-% Alkohol.  
Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung werden bei der Akutdosierung bis zu 2,1 g Alkohol und bei der chronischen Dosierung bis zu 0,5 g Alkohol zugeführt.

Ein gesundheitliches Risiko besteht u.a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder Hirngeschädigten sowie für Schwangere und Kinder. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.

#### Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt.

##### Allgemeiner Hinweis:

In der Homöopathie ist bekannt, daß die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genußmittel ungünstig beeinflusst werden kann. Falls Sie sonstige Medikamente einnehmen, holen Sie medizinischen Rat ein.

#### Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:

*Wie oft und in welcher Menge sollten Sie 58 Trillium S einnehmen?*

Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12mal täglich je 5-10 Tropfen sowie bei chronischen Verlaufsformen 1-3mal täglich je 5-10 Tropfen.

Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenenendosis.

Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte der Erwachsenenendosis.

Säuglinge bis zum 1. Lebensjahr erhalten nach Rücksprache mit dem Arzt nicht mehr als ein Drittel der Erwachsenenendosis.

*Wie und wann sollten Sie 58 Trillium S einnehmen?*

Die Einnahme erfolgt mit einem Teelöffel Wasser vor bzw. zwischen den Mahlzeiten.

*Wie lange sollten Sie 58 Trillium S anwenden?*

Auch homöopathische Medikamente sollten ohne medizinischen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

#### Nebenwirkungen:

Keine bekannt.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

##### Hinweis:

Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollte medizinischer Rat eingeholt werden.

#### Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums soll das Präparat nicht mehr angewendet werden.

#### Stand der Information:

Februar 2001